



Blemil plus 2 AE

Con todos los ingredientes de reconocido Efecto Anti-Estreñimiento: β -palmitato, AGPI-CL ω -3 y ω -6, innovadora combinación de FOS de cadena corta y cadena larga y magnesio.

CARACTERÍSTICAS

Blemil plus 2 AE es una leche para lactantes que satisface completamente las necesidades nutritivas del recién nacido desde los 6 meses de edad.

Blemil plus 2 AE aporta un elevado porcentaje de ácido palmítico en posición β (β -palmitato), Ácidos Grasos Poliinsaturados de Cadena Larga ω -3 y ω -6 (AGPI-CL), exclusiva combinación de FOS de cadena corta y cadena larga, nucleótidos y un incremento en la concentración de magnesio, por lo que resulta especialmente indicada para lactantes con tendencia al estreñimiento.

La eficacia de **Blemil plus 2 AE** ha sido clínicamente demostrada: El 80% de los lactantes muestran una mejora significativa de la sintomatología asociada al estreñimiento durante la primera semana de su utilización.

El β -palmitato favorece una mayor absorción de la fracción grasa, del calcio y del magnesio, aumentando la biodisponibilidad de estos nutrientes y minimizando la formación de jabones cálcicos a nivel intestinal, compuestos responsables de las heces duras que provocan el estreñimiento. Por esta razón, la adición de β -palmitato ayuda a disminuir la consistencia de las heces y aumentar su frecuencia.

Los AGPI-CL mejoran la digestión y absorción de la grasa, contribuyendo a la disminución de la formación de jabones cálcicos y, por tanto, a la disminución de la consistencia de las deposiciones.

Incluye en su composición una innovadora combinación de fructooligosacáridos de cadena corta y cadena larga, que reproduce los efectos fisiológicos de los oligosacáridos de la leche materna. Esta especial combinación de FOS garantiza que el efecto prebiótico se mantenga a lo largo de todo el intestino, ya que las cadenas cortas son fermentadas en la parte proximal y las cadenas largas en la parte distal. Gracias a ello, se estimula la instauración de una microbiota intestinal con un elevado contenido en bifidobacterias, como mecanismo de protección frente a infecciones gastrointestinales y el desarrollo de alergias, un pH ácido que incrementa la absorción de metales divalentes como el hierro, el calcio y el magnesio, y gracias a su estructura de fibra soluble que favorece el tránsito intestinal, los lactantes presentan deposiciones más frecuentes y de menor consistencia.

Por otro lado, la fermentación de los prebióticos ocasiona la formación de Ácidos Grasos de Cadena Corta, compuestos con efecto trófico a nivel intestinal que estimulan la maduración del tracto digestivo.

Los nucleótidos contribuyen al desarrollo y maduración del sistema digestivo y, al estimular la proliferación de la flora bifidógena, apoyan el papel Anti-Estreñimiento de los FOS. Además, **Blemil plus 2 AE** incrementa todavía más su capacidad Anti-Estreñimiento gracias al aumento de su concentración de magnesio:

- Las fórmulas infantiles con elevado contenido de lactosa y magnesio favorecen la hidratación de las heces y mejoran los síntomas del estreñimiento.
- La utilización de suplementos de magnesio resulta eficaz para reducir la prevalencia del estreñimiento en lactantes y niños de corta edad.
- Y ahora también con una reducción de los niveles de proteína, evitando un incremento excesivo de peso, y favoreciendo un crecimiento óptimo y una respuesta endocrina y metabólica más parecida a los lactantes alimentados al pecho.

Gracias a su completa fórmula, **Blemil plus 2 AE** consigue un eficaz efecto Anti-Estreñimiento al aumentar la frecuencia de las deposiciones, disminuir su consistencia y mejorar la sintomatología acompañante.

Blemil plus 2 AE resulta de gran utilidad en los problemas de estreñimiento que suelen aparecer en el período de transición de la lactancia materna a la lactancia artificial.

Blemil plus 2 AE resulta de gran utilidad en los problemas de estreñimiento que suelen aparecer en

el período de transición de la lactancia materna a la lactancia artificial.

Además de solucionar el estreñimiento, el perfil proteico de **Blemil plus 2 AE** se ha acercado al de la leche materna ya que una reducción del contenido proteico de las fórmulas infantiles se relaciona con una respuesta metabólica y endocrina más parecida a la de los lactantes alimentados al pecho, evitando una ingesta elevada de proteínas durante la primera infancia, que se relaciona con una ganancia de peso más acelerada y una mayor adiposidad. Este mecanismo puede ser determinante para el riesgo posterior de obesidad.

Blemil plus 2 AE también asegura el correcto desarrollo del lactante, ya que al igual que la leche materna aporta:

- AGPI-CL ω -3 (DHA) y ω -6 (Araquidónico), compuestos que en la leche materna se relacionan con el correcto desarrollo y maduración del Sistema Nervioso Central y la retina, favoreciendo un aumento de la agudeza visual y de los índices de desarrollo mental.
- Carnitina, indispensable para la oxidación eficiente de los ácidos grasos y la obtención de energía a partir de los mismos y de gran importancia en el desarrollo del Sistema Nervioso Central y la retina.
- Selenio y vitamina E, potentes antioxidantes que previenen la oxidación de los AGPI-CL ayudando a su correcta conservación y aprovechamiento nutricional.



INDICACIONES

Blemil plus 2 AE resulta de especial interés en la alimentación del lactante con tendencia al estreñimiento a partir de los 6 meses de edad como parte de una dieta diversificada.

Blemil plus 2 AE debe utilizarse como parte de una dieta diversificada y no debe emplearse como sustituto de la leche materna durante los primeros 6 meses de vida.

La decisión de cuándo iniciar la alimentación complementaria debe tomarla el pediatra o profesional sanitario que realice el seguimiento de cada bebé, basándose en sus necesidades específicas de crecimiento y desarrollo.

INGREDIENTES

Suero lácteo desmineralizado, Aceites vegetales (Aceites de palma, Aceite de palmiste, Aceite de nabina, Aceite de girasol), **Leche desnatada**, **Lactosa**, FOS (fructooligosacáridos, inulina), Minerales (Fosfato monocálcico, Citrato tripotásico, Cloruro de sodio, Carbonato cálcico, Cloruro potásico, Hidróxido de potasio, Citrato trisódico, Citrato tricálcico, Hidróxido cálcico, Sulfato de magnesio, Sulfato de hierro, Hidróxido de magnesio, Sulfato de zinc, Cloruro cálcico, Fosfato dipotásico, Sulfato de cobre, Sulfato de manganeso, Yoduro potásico, Selenito sódico, Molibdato sódico), **Aceite de pescado** (fuente de DHA), Emulgente (**Lecitina de Soja**), Vitaminas (Vitamina C, Vitamina E, Nicotinamida, Pantotenato Cálcico, Vitamina A, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina B2, Ácido Fólico, Vitamina K, Biotina, Vitamina D), Aceite de Mortierella alpina (Fuente de AA), Cloruro de colina, L-fenilalanina, Taurina, Nucleótidos (5'-Monofosfato de Citidina, 5'-Monofosfato de Uridina Disódica, 5'-Monofosfato de Adenosina, 5'-Monofosfato de Inosina Disódica, 5'-Monofosfato de Guanosina Disódica), Inositol, Antioxidantes (Mezcla de Tocoferoles y Palmitato de Ascorbilo), L-carnitina.

DOSIFICACIÓN

Blemil plus 2 AE se prepara con una medida de 4,8 g para cada 30 ml de agua. El alimento debe administrarse al lactante inmediatamente después de ser preparado. No reutilizar el contenido del biberón después de la toma.

Salvo indicación facultativa se recomienda la siguiente dosificación:

Edad	Medidas (4,8g)	Agua (ml)	Nº biberones diarios
6º Mes en adelante	8	240	4



FORMATOS

Lata de 800 g

C.N.: 251868.1 - 800 g